若年性特発性関節炎 トシリズマブ治療の理論と実際 2009

お詫びと訂正

『若年性特発性関節炎 トシリズマブ治療の理論と実際 2009』の中で誤りがありましたので,
下記の通り謹んで訂正いたします。

頁	薬剤名など	訂正箇所	誤	正
P.28		-	このことはメトトレキサートの安全性と有効性を示している. 成人では多種の疾患修飾抗リウマチ薬（DMARD）が用いられているが，小児で効果が明らかな DMARD は注射用金剤（ブシラミン）のみである. MAP 療法に抵抗する年長児に用いられることはあるが，間質性腎炎，無顆粒球症などの副作用がある. 成人で頻用されるリマチル®は腎毒性のため使用しない（図 5）.	このことはメトトレキサートの安全性と有効性を示している（図 5）. 成人では多種の疾患修飾抗リウマチ薬（DMARD）が用いられているが，小児で効果が明らかな DMARD はスルファサラジンと注射用金剤（シオゾール®）のみである. MAP 療法に抵抗する年長児に用いられることはあるが，間質性腎炎，無顆粒球症などの副作用がある. 成人で頻用されるリマチル®は腎毒性のため使用しない.

読者ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。