# 単行本『高血圧ナビゲーター第3版』お詫びと訂正

本書におきまして、下記の誤りがございました。

## 196頁

| 誤（投与量） | 正（投与量） |
|---|---|
| V20～320mg＋C6.25～150mg 群 | V20～160mg＋C6.25～150mg 群 |

## 245頁

誤

| Prichard による分類 | | | 一般名 | レニン分泌抑制 | 分配係数 | 血液脳関門通過 | 主要排泄経路 | 血管拡張作用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑選択性 | ISA | MSA | | | | | | |
| 非選択性 | ＋ | ＋ | インデノロール | ＋＋ | | ＋ | 肝＝腎 | ISA |
| | ＋ | ＋ | ボピンドロール | ＋ | 10.2（pH7.0） | ＋ | 肝＝腎 | ISA |
| | ＋ | ＋ | ペンブトロール | ＋ | 44.8（pH7.8） | ＋ | 腎 | ISA |
| | － | ＋ | プロプラノロール | ＋＋ | 20.2 | ＋ | 肝 | |
| | ＋ | － | カルテオロール | ± | 0.35 | － | 肝＞腎 | ISA |
| | ＋ | － | ピンドロール | － | 0.82 | ＋ | 肝＞腎 | ISA |
| | － | － | チリソロール | ＋ | 0.21 | － | 肝＜腎 | |
| | － | － | ニプラジロール | ＋ | 2.1 | － | 肝＝腎 | NO 産生＋↑遮断（弱い） |
| | － | － | ナドロール | ＋ | 0.066 | － | 腎 | |
| ↑選択性 | ＋ | ＋ | アセブトロール | ＋ | 0.06 | － | 肝＝腎 | ISA |
| | ＋ | － | セリプロロール | ± | 0.06 | － | 肝＝腎 | ISA |
| | － | － | アテノロール | ＋ | 0.015 | － | 腎 | |
| | － | － | ベタキソロール | ＋ | 4.03 | ± | 肝＜腎 | Ca 拮抗作用 |
| | － | － | ビソプロロール | ＋ | 1.09（pH7.0） | － | 腎 | |
| | － | － | メトプロロール | ＋ | 0.98 | － | 腎 | |
| 遮断薬 | ＋ | ＋ | ラベタロール | ＋ | 11.5 | ± | 肝＜腎 | ISA＋↑遮断 |
| | － | ＋ | カルベジロール | － | 226 | ＋ | 肝 | ↑遮断 |
| | － | ＋ | ベバントロール | ＋ | 17.3 | ± | 肝 | ↑遮断 |
| | － | － | アロチノロール | ＋ | 1.2 | － | 肝 | ↑遮断 |
| | － | － | アモスラロール | ＋ | 5.5 | － | 肝＞腎 | ↑遮断 |

分配係数：pH7.4 における n－octanol/ 水分配係数

正

| Prichard による分類 | | | 一般名 | レニン分泌抑制 | 分配係数 | 血液脳関門通過 | 主要排泄経路 | 血管拡張作用 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $\beta_1$選択性 | ISA | MSA | | | | | | |
| 非選択性 | ＋ | ＋ | インデノロール | ＋＋ | | ＋ | 肝＝腎 | ISA |
| | ＋ | ＋ | ボピンドロール | ＋ | 10.2（pH7.0） | ＋ | 肝＝腎 | ISA |
| | ＋ | ＋ | ペンブトロール | ＋ | 44.8（pH7.8） | ＋ | 腎 | ISA |
| | － | ＋ | プロプラノロール | ＋＋ | 20.2 | ＋ | 肝 | |
| | ＋ | － | カルテオロール | ± | 0.35 | － | 肝＞腎 | ISA |
| | ＋ | － | ピンドロール | － | 0.82 | ＋ | 肝＞腎 | ISA |
| | － | － | チリソロール | ＋ | 0.21 | － | 肝＜腎 | |
| | － | － | ニプラジロール | ＋ | 2.1 | － | 肝＝腎 | NO 産生＋$\alpha_1$遮断（弱い） |
| | － | － | ナドロール | ＋ | 0.066 | － | 腎 | |
| $\beta_1$選択性 | ＋ | ＋ | アセブトロール | ＋ | 0.06 | － | 肝＝腎 | ISA |
| | ＋ | － | セリプロロール | ± | 0.06 | － | 肝＝腎 | ISA |
| | － | － | アテノロール | ＋ | 0.015 | － | 腎 | |
| | － | － | ベタキソロール | ＋ | 4.03 | ± | 肝＜腎 | Ca 拮抗作用 |
| | － | － | ビソプロロール | ＋ | 1.09（pH7.0） | － | 腎 | |
| | － | － | メトプロロール | ＋ | 0.98 | － | 腎 | |
| $\alpha\beta$遮断薬 | ＋ | ＋ | ラベタロール | ＋ | 11.5 | ± | 肝＜腎 | ISA＋$\alpha_1$遮断 |
| | － | ＋ | カルベジロール | － | 226 | ＋ | 肝 | $\alpha_1$遮断 |
| | － | ＋ | ベバントロール | ＋ | 17.3 | ± | 肝 | $\alpha_1$遮断 |
| | － | － | アロチノロール | ＋ | 1.2 | － | 肝 | $\alpha_1$遮断 |
| | － | － | アモスラロール | ＋ | 5.5 | － | 肝＞腎 | $\alpha_1$遮断 |

分配係数：pH7.4 における n－octanol/ 水分配係数

執筆者ならびに読者の皆様方にご迷惑をおかけ致しましたことをお詫び申し上げますとともに、謹んで訂正させていただきます。

株式会社メディカルレビュー社　編集部