お詫びと訂正

本誌 Vol.33 No.2（2015 年 2 月号）に，下記の誤りがございました。

p.80 ～ 85 掲載　「2 型糖尿病における基礎インスリンとリキシセナチド併用療法の有効性および安全性に関する検討　第二報」

p.82　表 2 内　「BOT」項目中の「体重（kg）」，「総インスリン投与量（単位 / 日）」，「基礎インスリン投与量（単位 / 日）」の数値（下線部）

×誤

	対象全体	BOT	Basal Plus	Basal Bolus
患者数（人）	25	15	5	5
年齢（歳）	67.3 ± 12.4	68.3 ± 9.5	70.2 ± 13.6	61.2 ± 19.0
性別（男性 / 女性）	9/16	5/10	2/3	2/3
罹病期間（年）	17.9 ± 9.2	17.3 ± 5.5	14.8 ± 15.6	22.8 ± 10.6
体重（kg）	61.8 ± 12.6	61.7 ± 12.8	63.2 ± 12.6	60.8 ± 14.9
BMI（kg/m^2）	25.1 ± 3.0	24.7 ± 2.7	26.2 ± 4.0	25.3 ± 3.1
HbA1c（%）	8.6 ± 1.3	8.5 ± 0.8	9.1 ± 2.4	8.5 ± 1.4
総インスリン投与量（単位 / 日）	15.2 ± 8.4	11.3 ± 7.3	18.0 ± 4.7	24.0 ± 7.3
基礎インスリン投与量（単位 / 日）	11.4 ± 6.4	11.3 ± 7.3	10.8 ± 3.0	12.0 ± 7.3
追加インスリン投与量（単位 / 日）	3.8 ± 5.3	－	7.2 ± 3.6	12.0 ± 0.0

・
・
・

○正

	対象全体	BOT	Basal Plus	Basal Bolus
患者数（人）	25	15	5	5
年齢（歳）	67.3 ± 12.4	68.3 ± 9.5	70.2 ± 13.6	61.2 ± 19.0
性別（男性 / 女性）	9/16	5/10	2/3	2/3
罹病期間（年）	17.9 ± 9.2	17.3 ± 5.5	14.8 ± 15.6	22.8 ± 10.6
体重（kg）	61.8 ± 12.6	61.8 ± 12.8	63.2 ± 12.6	60.8 ± 14.9
BMI（kg/m^2）	25.1 ± 3.0	24.7 ± 2.7	26.2 ± 4.0	25.3 ± 3.1
HbA1c（%）	8.6 ± 1.3	8.5 ± 0.8	9.1 ± 2.4	8.5 ± 1.4
総インスリン投与量（単位 / 日）	15.2 ± 8.4	11.5 ± 7.4	18.0 ± 4.7	24.0 ± 7.3
基礎インスリン投与量（単位 / 日）	11.4 ± 6.4	11.5 ± 7.4	10.8 ± 3.0	12.0 ± 7.3
追加インスリン投与量（単位 / 日）	3.8 ± 5.3	－	7.2 ± 3.6	12.0 ± 0.0

・
・
・

p.87 ～ 95 掲載「心房細動患者における心血管イベントの疾病負担：ダビガトランおよびワルファリンの医療経済的効果」

p.89　本文右段 25 行目

×誤　「・・・以下の割合はそれぞれ 35.6%，69.7% ・・・」

○正　「・・・以下の割合はそれぞれ 69.7%，35.6% ・・・」

同 28 行目

×誤　「・・・を 24.8%（35.6%×69.7%）と仮定し，・・・」

○正　「・・・を 24.8%（69.7%×35.6%）と仮定し，・・・」

読者および関係各位にご迷惑をお掛け致しましたことを深くお詫び申し上げますとともに，謹んで訂正させていただきます。